



మూతా శిశు సంరక్షణ (MCP) కార్డు



**వైద్య, ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము**

ఈ యం.సి.పి కార్డును జాగ్రత్తపరచి లింగనీవాడి సెంటర్కు, ఆసుపత్రికి వెళ్లితప్పదు మరియు
VHN Day (గ్రామీణ ఆరోగ్య పోషణ దినం) నాడు వెళ్లితప్పదు తప్పనిసరిగా తీసుకుని వెళ్ళవలెను.

ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన (PMMVY) ప్రయోజనాలు (మొదటి శిశువుకు మాత్రమే)

ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన కార్యక్రమం క్రింద ప్రతి గర్భిణీ స్త్రీకి (మొదటి బిడ్డ ప్రసవం కొరకు) రూ. 5000/- నగదు పారితోషికాన్ని మూడు విడతలుగా అందజేయబడుతుంది.

మొదటి విడత : ప్రతి గర్భిణీ స్త్రీ తప్పనిసరిగా ఆరోగ్యకేంద్రము / అంగన్ వాడీ కేంద్రాలలో గానీ నమోదు చేయించుకొన్న వెంటనే మొదటి విడతగా రూ. 1000/- ఇవ్వబడును.

sachivalayam.com

రెండవ విడత : గర్భిణీ స్త్రీ (6 నెలలు నిండిన తరువాత) గర్భిణీ సేవలు పొందినప్పుడు రూ. 2000/- ఇవ్వబడును.

3వ విడత : బిడ్డ పుట్టిన తరువాత నమోదు చేయించుకుని బిడ్డకు బిసిజి, ఓపివి, డిపిటి మరియు హెపటైటిస్-బి టీకాలు వేయించుకుని యం.సి.సి. కార్డులో నమోదు చేసిన తరువాత రూ. 2000 ఇవ్వబడును.

జనని సురక్ష యోజన (JSY)

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో ప్రసవించిన తల్లులు నగదు లబ్ధి పొందడానికి ఆర్డులు

గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ప్రసవం అయితే రూ. 1000/-, పట్టణ ప్రాంతాలలో ప్రసవం అయితే

రూ. 600/- ఇంటి వద్ద ప్రసవం అయితే రూ. 500/-

ప్రధానమంత్రి సురక్షిత మాతృత్వ అభియాన్ (PMSMA)

గర్భిణీ స్త్రీ ప్రతి నెల 9వ తేదిన 4వ నెల నుండి 9వ నెల వరకు తప్పనిసరిగా పరీక్ష చేయించుకోవాలి.

జనని శిశు సురక్ష కార్యక్రమము - ప్రయోజనాలు

గర్భవతులకు అందించు సేవలు

- ఉచిత మరియు నగదు రహిత సాధారణ కాన్సు
- ఉచిత సిజేరియన్ ఆపరేషన్ (అవసరమైతే)
- ఉచిత మందులు
- ఉచిత వైద్య పరీక్షలు (రక్తము, మూత్రము మరియు స్క్రీనింగ్ మొగ్గునవి)
- సాధారణ ప్రసవమునకు 3 రోజులు మరియు సిజేరియన్ జరిగితే 7 రోజుల వరకు ఆసుపత్రిలో ఉచిత ఆహారం అందిస్తారు.
- ఉచిత రక్త సరఫరా
- ఇంటి నుండి ఆసుపత్రికి మరియు మెరుగైన వైద్యసేవలకొరకు రెఫరల్ ఆసుపత్రికి, ఆసుపత్రి నుండి తిరిగి ఇంటికి ఉచిత రవాణా సౌకర్యము
- గర్భవతికి, బాలింతకు మరియు శిశువు యొక్క ఆరోగ్య సమస్యలకు చికిత్స చేయబడును.

శిశువుకు పుట్టినప్పటి నుండి 1 సం॥ వరకు లభించు సేవలు :

- ఉచిత చికిత్స
- ఉచిత మందులు
- ఉచిత నిర్ధారణ పరీక్షలు
- ఉచిత రక్త సరఫరా
- ఇంటి నుండి ఆసుపత్రికి మరియు మెరుగైన వైద్యసేవలకొరకు రెఫరల్ ఆసుపత్రికి, ఆసుపత్రి నుండి తిరిగి ఇంటికి ఉచిత రవాణా సౌకర్యము

"మొందస్తు గర్భస్థ బంగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేట్టలేత్తా నేరము"



జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ

మాతా శిశు సంరక్షణ కార్డు

కుటుంబ గుర్తింపు వివరాలు

తల్లి పేరు _____ వయసు _____

తండ్రి పేరు _____

చిరునామా _____

తల్లి ఫోన్ నెంబరు _____ తండ్రి _____

MCTS / RCH ID _____

బ్యాంకు & బ్రాంచి పేరు _____

అకౌంటు నెం. IFSC కోడ్ _____

గర్భవతి రికార్డు

చివరగా బహిష్టు అయిన తేది (LMP) _____

అంచనా ప్రకారం ప్రసవ తేది (EDD) _____

ఇప్పటిదాకా అయిన గర్భముల సంఖ్య / ప్రాణాలతో జన్మించిన శిశువుల సంఖ్య _____

గత ప్రసవం జరిగిన ప్రదేశం _____

ప్రస్తుత ప్రసవం ఎక్కడ నిర్వహించబడినది _____

ప్రస్తుత ప్రసవం ఎక్కడ జరిగినది _____

పుట్టిన శిశువు వివరాలు

శిశువు పేరు _____

పుట్టిన తేది _____ బరువు _____

☐ ఆడ ☐ మగ జనన నమోదు సంఖ్య _____

MCTS / RCH ID (శిశువు) _____

ఆసుపత్రి వివరాలు

అంగన్వాడీ కార్యకర్త సంఖ్య _____ బ్లాకు / గ్రామం / వార్డు పేరు _____

ఆశా పేరు _____ ఎ.ఎన్.ఎమ్ పేరు _____

SHC / క్లినిక్ పేరు ఫోన్ నెంబరు _____

PHC / పట్టణం పేరు _____ ఆసుపత్రి / FRU _____

ఎ.ఎన్.ఎమ్ ఫోన్ నం. _____

ఆసుపత్రి ఫోన్ నం. _____

AWC నమోదు సంఖ్య _____ తేది _____

ఉపతీంద్రం నమోదు సంఖ్య _____ తేది _____

ఎక్కడికి రెఫర్ చేశారు _____

శిశువు ఆధార్ సంఖ్య _____

తల్లి ఆధార్ సంఖ్య _____

అంబులెన్స్ టోల్ ఫ్రీ నెంబరు _____



శిశు ఆరోగ్య పరీక్ష అవసరం

గర్భవతి స్థితి ప్రమాదకరమైనదా ? ☐

	No Risk	
	High Risk	
	PIH	
	Co Morbid	
	Previous LSCS	

గర్భవతి కాలంలో క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి

నెలలు	1వ	2వ	3వ	4వ	5వ	6వ	7వ	8వ	9వ
									
	మొదటి ప్రామాణికం ఆరోగ్యకేంద్రంలో నమోదు చేసుకోండి. తేది / నెల / సం								
	2. గర్భవతి పరీక్షలు నమోదు తరువాత కనీసం మూడుసార్లు గర్భవతి పరీక్షలు చేయించుకోండి.								
	3. సాధారణ పరీక్షలు ఆరోగ్యకేంద్రాన్ని సందర్శించిన ప్రతిసారి రక్తపోటు (బి.పి.), రక్తం మరియు మూత్ర పరీక్షలు చేయించుకోండి.								
	4. బరువు ప్రతిసారి బరువు చూసుకోండి. గర్భవతి కాలంలో కనీసం 10-12 కిలోల బరువు పెరగాలి.								
	5. ఇంజక్షన్ రెండు సార్లు బి.డి. ఇంజక్షన్లు చేయించుకోండి. మొదటిది : గర్భ నిర్ధారణ ఐరిగాక, రెండవది : 16 వారాల తరువాత (తేది నమోదు చేయండి) 3వ మార్చులో వ్యాక్సిన్ చేయించుకుని ఉంచే కేవలం 16 వారాల బి.డి. మూడోదా చేయించుకోండి.								
	6. ఐరన్ ఫోలిక్ షాత్రలు మొదటి ప్రామాణికం తరువాత రోజూ 16 ఐరన్ మూత్ర కనీసం ఆరు వెలల పాటు తీసుకోండి. మొత్తం మీద కనీసం 180 మూత్రాలు తీసుకోండి. (నెలలో తీసుకున్న మూత్రాల సంఖ్యను నమోదు చేయండి).								

మొదటి ప్రామాణికం తరువాత రోజూ రెండు కార్ట్యుం మూత్రాలు కనీసం ఆరు నెలల పాటు తీసుకోండి. (నెలలో ఎన్ని మూత్రాలు తీసుకున్నారో నమోదు చేయండి).

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

మొదటి ప్రామాణికం తరువాత అల్పిండవోల్ (400 మి.గ్రా) దోసు ఒకటి తీసుకోండి. (తీసుకున్న తేదిని నమోదు చేయండి).

--

గర్భవతి కాలంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు



- వివిధ రకాల ఆహారం తీసుకోండి.
- మామూలు కంటే పావు భాగం ఆహారం ఎక్కువ తీసుకోండి
- అంగమ్మవాడి కేంద్రం నుండి పాస్టికాహారాన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోండి
- ఆహారం తిన్న ప్రతిసారి నోరు పుక్కిలించండి. రోజూ కనీసం రెండు సార్లు పళ్లు తోమాలి.



- రాత్రిపూట 8 గంటలు నిద్రపోవాలి.
- పెగటిపూట అదనంగా కనీసం రెండు గంటలు నిశ్చంతి తీసుకోండి.
- అయోడిన్ కలిగిన ఉప్పును తగు మోతాదులో తీసుకోండి.

గర్భవతి పరీక్షకు వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఎలాంటి పాస్టికాహారం తీసుకోవాలో తెలుసుకోండి

(Check list for SpecialCare)

ఈ క్రింది ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో ప్రతినెల తప్పనిసరిగా నిపుణులతో పరీక్ష చేయించుకొనవలెను.

మునుపటి గర్భస్థ సమయంలో

HIGH RISK

VERY HIGH RISK

- | | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| 1. Instrumental delivery /
ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ప్రసవం (ఫోర్సెప్స్) | ☐ | 6. Previous Pre term delivery
నెలలు నిండక ముందే కాన్పు జరుగుట | ☐ |
| 2. Eclampsia / వాతము | ☐ | 7. Still birth / Neonatal death /
మృత శిశువు జన్మించుట, కాన్పు
అయిన నెలలోపు మరణించుట | ☐ |
| 3. PPH / రక్తస్రావము | ☐ | 8. Caesarean Section / సిజేరియన్ | ☐ |
| 4. 3 or more Abortions /
3 కంటే ఎక్కువ గర్భస్రావము | ☐ | 9. Other Obstetri Compliations | ☐ |
| 5. Obstruted Labour | ☐ | 10. Congenital Anomalies | ☐ |

ప్రస్తుత గర్భ సమయంలో

- | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| 1. Primigravida under 18 years
ప్రథమ గర్భము 18 సం॥లోపు | ☐ | 1. Premature labour
నెలలు నిండకముందే నొప్పులు వచ్చుట | ☐ |
| 2. Primigravida Above 35 years /
ప్రథమ గర్భము 35 సం॥పైన | ☐ | 2. Ante Partum Haemorrhage
కాన్పుకు ముందు రక్త స్రావం | ☐ |
| 3. Age above 40 years /
గర్భిణి వయస్సు 40 సం॥పైన | ☐ | 3. Abnormal Presentation
పిండం అసాధారణ స్థితి | ☐ |
| 4. Pregnancy after Prolanged infertility
చాలా సం॥ల వంధ్యత్వము తర్వాత గర్భధారణ | ☐ | 4. Intra Uterine Growth Retardation
పిండం పెరుగుదల లేకపోవుట | ☐ |
| 5. Fourth Pregnancy or greater
4 లేదా అంతకంటే ఎక్కువసార్లు గర్భందాల్చుటము | ☐ | 5. Multiple Pregnancy
కవలలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ | ☐ |
| 6. Height less than 145cm
గర్భిణి ఎత్తు 145 సెం.మీ. కంటే తక్కువ | ☐ | 6. Hydramnios / ఉమ్మనీరు ఎక్కువ ఉండుట | ☐ |
| 7. Systemic Disease
దీర్ఘకాలిక రుగ్మతలు | ☐ | 7. PIH / గర్భస్థ సమయంలో రక్తపోటు ఎక్కువవుట | ☐ |
| 8. Threatened abortion
గర్భస్రావం | ☐ | 8. Severe Anaemia / తీవ్రమైన రక్తహీనత | ☐ |
| 9. Other / Minor Complication
ఇతర సమస్యలు | ☐ | 9. Cardiac Disease / గుండె జబ్బులు | ☐ |
| | | 10. Diabetes Mellitus / మధుమేహం | ☐ |
| | | 11. Gestation exceeding 42 weeks
42 వారములు నిండినా ప్రసవం కాకపోవటం | ☐ |

Note : హై రిస్క్ గా గుర్తించిన గర్భవతుల నెలసరి చెకప్ మరియు స్పెషలిస్ట్ ద్వారా జరగవలెను.

Conduct deliveries of all High Risk Pregnant women in refferal hospital only.

ప్రమాదకర గర్భస్థితి ఉన్న గర్భవతుల ప్రసవము రిఫరల్ ఆసుపత్రిలోనే జరుగవలెను.

Designation : ANM / ASHA

[illegible]

Type of Referral Hospital	PHC	CHC	AH	DH	TH
Name of Referral Hospital					

[illegible]

Mention any other remarks / Ultrasound impression :

1. All Pregnant women should be escorted by ANM / ASHA for deliveries as ESCORT PERSON.
గర్భవతులను ఆరోగ్యకార్యకర్త ANM / ASHA కానీ వెంట ఉండి ప్రసవం కొరకు తీసుకొనిపోవాలెను.
2. Amount should be utilized from JSSK funds for transport of pregnant women in case of ANC checkup, Delivery transport PNC Checkups to Public Health Institutions.
గర్భవతులకు రవాణా సౌకర్యము కొరకు అయ్యే ఖర్చులను JSSK పథకము క్రింద తీసుకొనవలెను.

Name of the Escort Person :

Designation : MPHS (F) / PHN

[illegible]

Type of Referral Hospital	CHC	AH	DH	TH
Name of Referral Hospital				

[illegible]

Mention any other remarks / Ultrasound impression :

1. All High Risk Pregnant women should be escorted by PHN or MPHS (F) or ANM for deliveries as ESCORT PERSON. ప్రమాదకర గర్భస్థ స్త్రీలి ఉన్న గర్భవతులను ఆరోగ్యకార్యకర్త ANM or MPHS (F) / PHN కానీ వెంట ఉండి ప్రసవం కొరకు తీసుకొనిపోవాలి.
2. Amount should be utilized from JSSK funds for transport of pregnant women in case of ANC checkup, Delivery transport PNC Checkups to Public Health Institutions. ప్రమాదకర గర్భస్థస్త్రీలి ఉన్న గర్భవతులకు రవాణా సౌకర్యము కొరకు అయ్యే ఖర్చులను JSSK పథకము క్రింద తీసుకొనవలెను.

ప్రసూతి సంరక్షణ

గత ప్రసవ సమయంలో తలెత్తిన సమస్యలు (సరైనదానికి ✓ పెట్టండి)

పూర్వపు వ్యాధుల వివరాలు

(Please tick (✓) the box of the appropriate response/s)

1. క్షయ ☐ 2. రక్తపోటు ☐ 3. గుండె సంబంధిత వ్యాధులు ☐
 4. మధుమేహం ☐ 5. ఆస్తమా పరీక్షలు ☐ 6. ఇతరాలు ☐

EXAMINATION

గుండె	ఊపిరితిత్తులు	రోమ్ము (చనుమొస లోపలికి పోయిందేమో గమనించండి)

గర్భిణీ స్త్రీ సంరక్షణ - సందర్శన వివరాలు

	1	2	3	4	5 (Under PMSMA)
తేది					
సమస్య					
POG (వారాలు)					
బరువు (కి.గ్రాల్లో)					
పల్స్ రేటు					
రక్తపోటు					
Pallor					
Oedema					
కామెర్లు					

ఉదర పరీక్షలు

Fundal height Weeks / cm				
Lie/Presentation				
Fetal movements	Normal Reduced/ Absent	Normal Reduced/ Absent	Normal Reduced/ Absent	Normal Reduced/ Absent
Fetal heart rate per minute				
P/V if done				

తప్పనిసరి పరీక్షలు

Investigation	Date	Date	Date	Date
రక్తపరీక్ష Hb%				
మూత్రం (ఆల్బుమిన్)				
మూత్రం (షుగర్)				
ఇ.సి.జి.				
హెచ్.ఐ.వి. & సిఫిలిస్				
అల్ట్రా సోనోగ్రఫీ				
గస్ట్రోప్లనల్ దయాటెజీస్ మిల్లిటస్				

బ్లడ్ గ్రూప్ & (Rh) టైపింగ్ తేది

చేసుకోదగ్గ పరీక్షలు

1. థైరాయిడ్-స్టిమ్యులేటింగ్ హోర్మోన్ తేది 2. Hbs Ag. తేది 3. బ్లడ్ షుగర్ తేది 

మాతాశిశు ఆరోగ్యం మరియు పౌష్టికాహారంపై ప్రతినెలా తప్పనిసరిగా మీ ఊరిలో జరిగే కార్యక్రమంలో పాల్గొనండి.

INVESTIGATION FINDINGS AND DOCTOR PRESCRIPTION

sachivalayam.com

INVESTIGATION FINDINGS AND DOCTOR PRESCRIPTION

sachivalayam.com

INVESTIGATION FINDINGS AND DOCTOR PRESCRIPTION

ఈ క్రింద కనబరచిన ప్రమాద సూచికలు గర్భిణి స్త్రీలలో కనిపిస్తే వెంటనే మీకు దగ్గరలోని ఆసుపత్రికి తరలించండి.




- గర్భవతి కాలంలో రక్తస్రావం
- ప్రసవ సమయంలో లేదా ప్రసవం తర్వాత వెంటనే వరకు రక్తస్రావం జరిగితే



అధిక రక్తహీనత,
శ్వాస తీసుకోవడంలో అయోసుం



ప్రసవం తర్వాత వెంటనే
తీవ్రమైన జ్వరం వస్తే



తలనొప్పి, చూపు మందగించడం,
మూర్ఛ, తరచు అంతటా వాపులు



12 గంటలకు పైగా షుగర్ నొప్పులు



షుగర్ నొప్పులు లేకుండా
ఉమ్మగీరు / మాయ జ్వరం

ఆసుపత్రిలో ప్రసవానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి



ఆశా/ఎ.ఎస్.ఎమ్/అంగన్వాడీ
కార్యకర్తలను సంప్రదించండి.



జనని సురక్ష యోజన (JSY)
కింద నమోదు చేసుకోండి



JSY ప్రయోజనాలను పొందండి



ఆసుపత్రిని ముందే
ఎంపిక చేసుకోండి



రవాణా సౌకర్యాన్ని
ముందే ఏర్పాటు చేసుకోండి



ప్రసవం అయిపోయాక 48 గంటలు
తప్పక ఆసుపత్రిలోనే ఉండండి.

అత్యవసర పరిస్థితి తలెత్తితే



ఆసుపత్రికి వెళ్లడానికి
వాహనం సిద్ధం చేసుకోండి.

ప్రసవం తర్వాత



గంటలోపు తల్లిపాలు
ఇవ్వాలి



కుటుంబ నియంత్రణ
కౌన్సిలింగ్కు హాజరు కావడం.

అవును ☐ కాదు ☐

0-6 నెలల వరకు తప్పనిసరిగా తల్లిపాలు పట్టించండి

ప్రసవానంతర సంరక్షణ

ప్రసవం జరిగిన తేది

ప్రసవం జరిగిన ప్రదేశం

ప్రసవం జరిగిన పద్ధతి

సాధారణ

ఫోర్స్

సిజేరియన్

టర్మ్ / ప్రీటర్మ్ / స్పాంటేనియస్ అబార్షన్ _____

ప్రసవం తర్వాత ఆసుపత్రిలో ఉన్న రోజులు _____

ఏవైనా సమస్యలున్నాయా _____

పుట్టిన బిడ్డ

 మగ ఆడ

బరువు

కిలోలు

గ్రాములు

బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే ఏడ్చినదా?

 అవును కాదు

బిడ్డ పుట్టిన గంటలోపు తల్లి పాలు తాగినదా?

 అవును కాదు

* (బిడ్డ బరువు 2.5 కి.గ్రా కంటే తక్కువ ఉంటే 3 సార్లు ఆసుపత్రి సందర్శించాలి)

విటమిన్ K ఇంజక్షన్

 అవును కాదు

బాలింత సంరక్షణ

	1వ రోజు	3వ రోజు	7వ రోజు	14వ రోజు	21వ రోజు	28వ రోజు	42వ రోజు
Any complaints							
Pallor							
Pulse rate							
Blood pressure							
Temperature							
Breasts Soft/engorged							
Nipples Cracked/normal							
Uterus Tenderness Present/absent							
Bleeding P/V Excessive/normal							
Lochia Healthy/foul smelling							
Episiotomy/Tear Healthy/injected							
Family planning Counselling							
Any other complications and referral							

నవజాత శిశువు సంరక్షణ

[if born <2.5 kgs, 3 additional visits planned by MPHA (F)]

	1వ రోజు	3వ రోజు	7వ రోజు	14వ రోజు	21వ రోజు	28వ రోజు	42వ రోజు
సందర్శన తేది	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
బిడ్డ పాలు సరిగా తాగుతున్నది / లేదు							
తాగకపోతే కారణాలు							
శ్వాస వీల్పుట (విమిషానికి ఎన్నిసార్లు)							
చాతిలో ఎరికి పోతుంది (అవును/కాదు)							
జ్వరము							
బొడ్డు చీము పట్టినది / లేదు							
చర్మం మీద బొబ్బలు/మచ్చలు							
కామెర్లు							
అపస్మారక స్థితి / మగత							
మూత్ర విసర్జన							
మల విసర్జన (సాధారణ / నీళ్ళుగా)							
విరేచనములు (రోజుకి ఎన్నిసార్లు)							
తదుపరి సందర్శన తేది	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
సంతకం							
ఎమ్.పి. హెచ్.ఎ (ఆడ) పేరు							

పుట్టిన 7 రోజుల వరకు
స్నానం చేయించకూడదు.

శిశువును
వెచ్చగా ఉంచాలి

జబ్బులతో బాధపడేవారి నుండి
శిశువును దూరంగా ఉంచాలి

బొడ్డుకి ఏమీ
రాయకూడదు.

నవజాత శిశు సంరక్షణ

దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి

- బిడ్డను వెచ్చగా ఉంచండి
- బిడ్డ పుట్టిన గంటలోనే తద్దపాలు ఇవ్వాలి
- బిడ్డను కేవలం తద్దపాలు కూడలేదు ఇవ్వాలి
- మొదటి 48 గంటలలోపు బిడ్డకు స్నానం చేయించరాదు
- పొచ్చు పూతం పొడిగా ఉండాలి
- బిడ్డను బయటకు వెళ్ళి దారికి దూరంగా ఉండాలి
- పుట్టినప్పుడు బిడ్డ బరువు 2.5 కిలోల కంటే తక్కువగా ఉంటే క్రమేపీ సంరక్షణ తీసుకోవాలి



దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి

- బిడ్డ పాలు తాగలేకపోతే
- మూర్చ తగ్గిపోతే
- బయటకు వెళ్ళి దారికి దూరంగా ఉండాలి
- పొచ్చు పూతం పొడిగా ఉండాలి
- బిడ్డను బయటకు వెళ్ళి దారికి దూరంగా ఉండాలి
- పుట్టినప్పుడు బిడ్డ బరువు 2.5 కిలోల కంటే తక్కువగా ఉంటే క్రమేపీ సంరక్షణ తీసుకోవాలి

గృహ ఆధారిత శిశు సంరక్షణ సందర్భనలు - ఆరు వారాల తర్వాత (✓)

వయసును బట్టి ఆశా కార్యకర్త పరిశీలించవలసినవి		3 నెలలు	6 నెలలు	9 నెలలు	12 నెలలు	15 నెలలు
బిడ్డ అనారోగ్యంతో ఉందా						
తల్లిపాలు కొనసాగిస్తున్నారా						
అదనపు ఆహారం	ఒకేసారి 2-3 టేబుల్ స్పూన్ల ఆహారం కోజుకు 2-3 సార్లు చొప్పున మధ్యలో 1-2 సార్లు అల్పాహారం	X				
	ఒకేసారికి 1/2 కప్పు ఆహారం కోజుకు 2-3 సార్లు చొప్పున మధ్యలో 1-2 సార్లు అల్పాహారం	X				
	ఒకేసారికి 3/4 నుంచి 1 కప్పు ఆహారం కోజుకు 3-4 సార్లు చొప్పున మధ్యలో 1-2 సార్లు అల్పాహారం	X				
అంగర్వాడీ కార్యకర్త నమోదుచేసిన బరువు						
ఎదుగుదల నెమ్మదిగా ఉందేమో చెక్ చేయండి						
టీకాల స్థితిని చెక్ చేయండి						
మీజిల్స్ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చారా		X	X			
బటమన్ A ఇచ్చారా		X	X		X	
ఇంటి వద్ద ఒ ఆర్ ఎస్ ఇచ్చారా						
ఇంటి వద్ద ఐ ఎఫ్ ఎ సిరస్ ఇచ్చారా						
వయసునుబట్టి ఆశా కార్యకర్త అందించవలసిన సేవలు		3 నెలలు	6 నెలలు	9 నెలలు	12 నెలలు	15 నెలలు
కేవలం తల్లిపాలు ఇవ్వడంపై కొన్నిలింగ్				X	X	X
అదనపు ఆహారం ఇవ్వడంపై కొన్నిలింగ్		X				
చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడంపై కొన్నిలింగ్						
బిల్లిల పెంపకంపై కొన్నిలింగ్						
కుటుంబ నియంత్రణపై కొన్నిలింగ్						
ఒ ఆర్ ఎస్ ఇవ్వడం						
ఐ ఎఫ్ ఎ సిరస్ ఇవ్వడం						

ಅಡಿಸಾರ ನಿವಾರಣ



అవసరం వచ్చే ముందు,
ఇద్దరు నిలిచినట్లు ముందు.
మరింతదూరం కలిగితే, ఇద్దరు
మరింతదూరంగా కలిగితే
నేను కలిగితే నేను
కలిగితే నేను నేను
కలిగితే నేను.



వీధులైనా తాగినీటిని
ఉపయోగించరాని,
తాగినీ నీరు క్షీణిస్తున్న
క్షుణ్ణిలో ఉంటాని.
నీరుక/ నీళ్ళ నీరు
నీరాక ఉంటాని.



ఇవ్వు కలిసిపోయి
కలిసిపోయి
ఉంటావని, ఇవ్వు
వేరువేరుగా వుంటావని
కలిసిపోయి ఉంటావని

[illegible]

ನಿಮೋನಿಯಾ ನಿವಾರಣೆ



చరణాలలో దిద్దుకు
వెచ్చటి పాదం బట్టతో కట్టి
ఉంచాలి. దిద్దు ఉత్త
దొబ్బాలతో గుర్రవేయాలి.



సదానాథ శివమూర్తి
బుద్ధుల ముక్తి ఉంచారి



ఇంటర్ పాగ
నివారించడానికి గ్యాస్
ప్రేమ్ బాధించ

అతిసారకు చికిత్స



ఒక రోజు రామచంద్రా
ఒక దొంగల ఒక వం
ను కలిపి



బుద్ధుడు అనిపించే పోలిక
రక్తము ౬ అలీ ఎస్
బాబాగారి మంచుబుద్ధుడ
పోయిన ప్రతిపది ౬ అలీ
ఎస్ బుద్ధుడు ఉండాలి.



16 రేపల్లవ ముందు
 దేవ శక్తివారు
 దేవునిది. అందరినీ మన
 ముందు కలసింది. దేవు
 లోను ఒకటే దామర
 14 పాదం దేవు ముందు



అధ్యక్షులు: మానవత్వం కోసం
అమెరికనులకు కృతజ్ఞులను
అర్పించుకోవాలి. అమెరికనులకు
కృతజ్ఞులను.

నిమోనియాను గుర్తించడం



తీర్మానము దగ్గు



దేంగా శ్వాస
తీసుకోవడం



చాతీ రోడ్డుకి
ప్రీతివదం



జ్వరం

శ్వాసించే సంఖ్యని బట్టి న్యూమోనియాను గుర్తించవచ్చు

వెంకట వేదాల తోపు బద్ధుల
: నవవిధానానికి 60 కంటే
ఎక్కువ సార్లు వ్యాస
తీసుకుంటూ ఉంటే

తెలుగు సెలవు నుండి ఒక
సంవత్సరం బాధలో నిమగ్న
10 కంటే ఎక్కువ నిన్ను బాధ
శిశువునందా ఉంటే

మంచి గ వందకీరాల
చురుగు పిల్లల్లో నామిషానికీ
40 కంటే ఎక్కువ సార్లు
జ్ఞాన దీప్తికలుస్తూ ఉంటే

బిడ్డలో న్యూమోనియా లేదా అతిసార లక్షణాలు కనిపిస్తే తక్షణమే
ఆశా కార్యకర్త లేదా ఎ ఎన్ ఎం ను సంప్రదించాలి

బిడ్డతో మాట్లాడుతూ ఉండండి. దీనివల్ల బిడ్డ శారీరకంగా, మానసికంగా చాలా బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది.

sachivalayam.com



మీ బిడ్డ పాళ్ళ చాలా రెచ్చగా నువ్వుతంగా ఉంటుంది. అది తల్లిపాలను మాత్రమే అరిగించుకోగలదు. బిడ్డ ఏడ్చినప్పుడు మీ శరీరానికి అంతలా పాటుకొండి. బిడ్డ మీ స్వచ్ఛమైన కోరుకుంటుంది. పాలు ఇస్తున్నప్పుడు బిడ్డ కళ్ళలోకి చూడండి, నవ్వుండి, మాట్లాడండి. పాలు ఇచ్చే సమయంలో బిడ్డను ఉదరము.



బిడ్డ పుట్టిన గంటల్లోగా, వీలైనంత త్వరగా తప్పకుండా పాలు ఇవ్వండి. ఇది పాలను సమృద్ధి చేస్తుంది. బిడ్డతో అనుబంధాన్ని పెంచుతుంది.



తల్లి నుంచి మొట్టమొదట వచ్చే ముద్రపాలు బిడ్డ ఆరోగ్యానికి అందగా నిలుస్తుంది.



బిడ్డ ఆకలితో ఏడ్చినప్పుడల్లా పాలు పట్టించండి. పగలు, రాత్రి కూడా పాలు పట్టిస్తూ ఉండాలి. తరచుగా పాలు ఇస్తుంటే పాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి.



తల్లి పాలలో అన్ని రకాల పోషకాలు, నీరు ఉంటాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ 6 నెలల వరకూ బిడ్డకు నీరు, తేనె, ఇతర అహారాలు, పానీయాలు లాంటివి ఇవ్వరాదు.



తల్లి పాలు త్రాగడం వలన బిడ్డ మేధస్సు పెరుగుతుంది



తల్లి పాలు త్రాగించడంలో ఎన్నైనా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడుకే ఎ.ఎన్.ఎమ్, అలా లేదా అంగవవాడీ కార్డులన్నీ సంప్రదించండి



మీ పాపాయికి నలభై ఉన్నప్పటికీ మొదటి 6నెలల వరకు తల్లి పాలు తాగిస్తూనే ఉండాలి. 6 నెలల తరువాత తల్లి పాలతో పాటు ఇతర ద్రవాలు, తక్కువ మోతాదులో మొత్తదీ అహారం రిసిపించాలి.

బిడ్డతో మాట్లాడండి, నవ్వుండి, ఓపికగా తినిపించండి

sachivalayam.com

6 నెలలు



- ❖ తల్లిపాలు కొనసాగించండి.
- ❖ 6 నెలలు పూర్తయ్యాక ఆహారం ఇవ్వటం మొదలు పెట్టండి. బాగా మెత్తగా చేసిన ఆహారాన్ని 2 నుండి 3 టేబుల్ స్పూన్లు రోజుకు 2 నుండి 3 సార్లు ఇవ్వండి.
- ❖ మెత్తగా చేసిన తృణ ధాన్యాలు, పప్పులు, పళ్ళు మరియు కూరగాయలు ఇవ్వాలి.
- ❖ ఒక్కసారి ఒకే రకమైన ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి.
- ❖ నెమ్మదిగా ఆహారాన్ని పెంచండి.
- ❖ ఐరన్ బ్రాప్స్ / సిరప్ ఇవ్వండి.
- ❖ మీ బిడ్డ మానసిక, శారీరక ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడుతుంది.

6-9 నెలలు



- ❖ తల్లిపాలు కొనసాగించండి.
- ❖ రోజుకు 3 నుండి 4 సార్లు ఆహారాన్ని ముద్దగా చేసి పెట్టండి. ఇది క్రమ క్రమంగా అలవాటు చేయండి. 2 నుండి 3 సార్లు ఆహారంగా మరియు 1 నుండి 2 సార్లు స్నాక్స్ గా పెట్టండి.
- ❖ ఆహారం మోతాదు క్రమంగా పెంచాలి.
- ❖ కిచిడి, ఉప్పొలొండి కొత్త ఆహారాన్ని తినిపించాలి.
- ❖ ఆహారంలో ఈ కింది 4 గ్రూపులు ఉండేలా చూడండి. 1) ధాన్యాలు 2) పచ్చడి కూరగాయలు, పళ్ళు 3) నూనె, నెయ్యి, 4) మెత్తగా చేసిన కందిపప్పు / చేప / గుడ్డు (బాగా ఉదకబెట్టినది)
- ❖ ఐరన్ బ్రాప్స్ / సిరప్ ఇవ్వండి. దీనివల్ల బిడ్డ శారీరకంగా, మానసికంగా చక్కటి అభివృద్ధి చెందుతుంది.

9-12 నెలలు



- ❖ తల్లిపాలు కొనసాగించండి.
- ❖ 9 నెలల తర్వాత సగం గిన్నె (చిన్నది) ఆహారాన్ని పెట్టాలి. రోజుకు 3-4 సార్లు పెట్టండి. ఆ ఆహారం బిడ్డ చప్పరించేలా ఉండాలి.
- ❖ 12 నెలల తర్వాత మీరు తినే ఆహారాన్ని పెట్టవచ్చు. ఒక చిన్న గిన్నెకు రోజుకు 3-4 సార్లు పెట్టాలి. అలాగే 1-2 సార్లు స్నాక్స్ రూపంలో ఇవ్వాలి.
- ❖ చిన్నగా తరిగిన / ముద్దలుగా చేసిన ఆహారాన్ని ఇవ్వండి. బిడ్డ సొంతగా బొటనవేలు, వేళ్లు ఉపయోగించి, తినేలా ఉండాలి. బిడ్డ చిందరవందర చేసినా మెల్లగా అలవాటు చేయండి.
- ❖ విటమిన్-ఎ ఇవ్వండి. బిడ్డ కందిచూపు చక్కగా ఉంటుంది.
- ❖ ఐరన్ బ్రాప్స్ / సిరప్ ఇవ్వండి. దీనివల్ల బిడ్డ శారీరకంగా, మానసికంగా చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

సాధారణ సూచనలు



- ❖ బిడ్డకు ఆహారాన్ని తయారు చేసే ముందు, తినిపించే ముందు శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కోండి.
- ❖ గుడ్డు ఇచ్చేటప్పుడు అది బాగా ఉడికిందో లేదో చూసుకోండి.
- ❖ పళ్ళు, కూరగాయలను ఎక్కువ నీటిలో కుళాయి కింద బాగా కడగాలి.
- ❖ బాగా ఉడికించాలి. సురక్షితమైన మంచినీటిని వాడండి. బిడ్డ ఆహారాన్ని మిగిలిస్తే దాన్ని పడేయండి. మళ్ళీ తినిపిద్దామని అలాగే పెట్టవద్దు.
- ❖ అయోడిన్ ఉన్న ఉప్పునే వాడండి. అయోడిన్ తెలివితేటలు పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
- ❖ ఐరన్ బ్రాప్స్ / సిరప్ ఇవ్వండి.

6 నెలల నుండి - 2 సం॥ల వరకు తల్లి పాలు త్రాగించండి. బిడ్డకు 2 సం॥లు వచ్చేవరకు తల్లి పాలతో పాటు మెత్తటి ఆహారాన్ని కూడా ఇవ్వండి

2 నుండి 3 నెలల వయస్సు



- ☐ తల్లిని గుర్తుపట్టడం
- ☐ ఇతరులను చూసి నవ్వడం
- ☐ కళ్ళలోకి చూడటం



- ♦ బిడ్డను తొగిలించుకోవారి, ముద్దాడారి.
- ♦ ఏడ్చిన వెంటనే బిడ్డను అక్కున చేర్చుకుంటే బిడ్డ సంకోషపడుతుంది.
- ♦ మీ మాతృభాషలో బిడ్డతో మాట్లాడుతూ ఉండండి.



- ♦ బిడ్డ పడువన్న లేట పైబాలో రోటో రోటో కొవ్వూ / అటో పట్టో పేలరుడుంటే టేవల్ బిడ్డ వాటిపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుంది.
- ♦ నసుల రోష పిల్లలకు టి.వి. సెట్ పోన్, బ్యాప్స్ అలవాట చేడకుంటే



- ☐ బోర్లా పడినప్పుడు అప్పుడప్పుడు తల ఎత్తడం



- ☐ తర్వాతంగా ఉన్నప్పుడు రెండు చేతులు, రెండు కాళ్ళు ఉపడం.
- ☐ చేతులను చాలి వికాసం పొందడం.



- ♦ బిడ్డనేతను, కాళ్ళను సున్నితంగా చుట్టడం చేడకుంటే
- ♦ బిడ్డ రోహలో కడిసం కొన్ని సార్లుగా రోహావేరొ చూడండి

3 నెలల వయస్సు

మీ బిడ్డలో కింది ప్రమాదకరమైన లక్షణాలు కనిపిస్తే తక్షణమే ఆరోగ్య కార్యకర్తను / ఆశా / అంగన్ వాడీ కార్యకర్తను వైద్యుడిని సంప్రదించండి



నవ్వుకపోతే




పాలు తాగుతున్నప్పుడు, మాట్లాడించినప్పుడు, ఎత్తుకున్నప్పుడు బిడ్డ కళ్ళలోకి చూడకపోతే



2 నెలల తర్వాత మెల్లకన్నుతో చూస్తుంటే



ఉన్నట్టుండి శబ్దమైనా బిడ్డ లేవకపోతే / ఏడవకపోతే



తల వెనక్కి వాలిపోయి, కాళ్ళు చేతులు నీలుక్కుపోతే



తరచుగా బొటనవేలు అరచేతిలోకి మడిచి పెట్టడం, పిడికిలి బిగించడం

☐ మహిళా ఆరోగ్య కార్యకర్త పైవాటిని పరిశీలించి ☒ లేదా ☒ పెట్టాలి

4 నెలల నుండి 6 నెలల వయస్సు

బిడ్డ ఏం చేస్తుంది?

తల్లిదండ్రులకు సూచనలు

sachivalayam.com



- ☐ శిశు విజారంగా ఉంది మీరు పట్టుకుంటే కూర్చోగలుగుతుంది.
- ☐ తల్లిని వచ్చిన వైపున శిశు తిప్పుతుంది.



- ✦ పిల్లలలో చూడబడింది. వారు చేసే శబ్దాలను మీరు అనుభవించండి.
- ✦ మీ శబ్దాన్ని వారు అనుభవించే వంటనే ప్రోత్సహించండి.



- ✦ బిడ్డను బయటకు తీసుకువెళ్లి బయటి ప్రపంచాన్ని పరిచడం చేయండి.

- ✦ బిడ్డ వేలు చీకడలో అనుభవాన్ని పొందుతుంది. దీని గురించి అందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడప్పుడే ఆ అలవాటును మార్చిందే ప్రయత్నం చేయవచ్చు.



- ☐ ఆ తా తా అని ముద్దుగా, అస్పృహగా మాట్లాడటం.
- ☐ అద్దంలో చూసుకోవడానికి ఇష్టపడటం.



- ☐ ఏదైనా వస్తువును చేరుకోవడానికి, పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించడం.
- ☐ గట్టిగా నవ్వడం, గట్టిగా అరవడం.



- ✦ బిడ్డకు ఇష్టమైన వస్తువులను వేలమీద వేయండి.
- ✦ బిడ్డ వాటిని అందుకునేలా ప్రోత్సహించండి.

6 నెలల వయస్సు

మీ బిడ్డలో క్రింది ప్రమాదకరమైన లక్షణాలు కనిపిస్తే తక్షణమే వైద్యసహాయం తీసుకోండి.

sachivalayam.com



శల / పెద మీద నియంత్రణ లేకపోతే



సహాయం చేసినా కూర్చోలేకపోతే



అందుబాటులో ఉన్నా వస్తువులను పట్టుకోకపోతే



ఆ తా తా లాంటి అస్పృహమైన శబ్దాలను పలకలేకపోతే



ఏదైనా కదులుతున్న వస్తువు వైపు దృష్టి సారించకపోతే



బోల్లా పడినప్పుడు శల ఎత్తలేకపోతే

- ☐ మహిళా ఆరోగ్య కార్యకర్త పైవాటిని పరిశీలించి ☒ లేదా ☒ పెట్టాలి

7 నెలల నుండి 9 నెలల వయస్సు

ఈ వయసు బిడ్డ ఏం చేస్తుంది?

తల్లిదండ్రులకు సూచనలు

sachivalayam.com



☐ రెండువైపులా తిరగడం



బిడ్డ వస్తువులను / ఆటవస్తువులను అదేపనిగా విసురుతూ తింటే ప్రోత్సహించండి. వారి ఆరుపులకు మీరు నెమ్మదిగా, ప్రశంసలతో, ఓపికగా స్పందించండి.



☐ అన్ని వేళ్లను ఉపయోగించి వస్తువును పట్టుకోవడం
☐ పరిచితమైన వ్యక్తులు / ఆటవస్తువులపైపు చూడటానికి తల తిప్పుడం



పరిశుభ్రమైన వస్తువులను అడుకోవడానికి ఇవ్వండి.



☐ తమ ముందుపైపు కనబడకుండా ఉన్న ఆట వస్తువులను వెతకడం
☐ మీరుతో పిలిచినప్పుడు స్పందించడం



ముఖాన్ని గుడ్డతో దాచిపెట్టి దాగుడుచూతల్లాగా ఆడండి. అలాగే వస్తువులతో కూడా ఆడించవచ్చు.

9 నెలల వయస్సు

మీ బిడ్డలో క్రింది ప్రమాదకరమైన లక్షణాలు కనిపిస్తే తక్షణమే వైద్యసహాయం పొందండి.



బొర్లకపోతే



కూర్చోవడానికి సహాయం అవసరమైతే



ఒకవైపు తలతిప్పి వస్తువులను చూస్తుంటే



శబ్దానికి అనుగుణంగా తల తిప్పుకపోతే



పాపాపా బాబాబా లాంటి శబ్దాలు పలకకపోతే

☐ మహిళా ఆరోగ్య కార్యకర్త పైవాటిని పరిశీలించి ☒ లేదా ☐ పెట్టాలి

ఈ వయసులో బిడ్డ ఏం చేస్తుంది?

తల్లిదండ్రులకు సూచనలు



- ☐ ఎలాంటి సహాయం లేకుండా కూర్చోవడం, ఆటవస్తువులను కచ్చితంగా అందుకోగలగడం.
☐ ఎత్తుకోమని చేతులు సాచడం



బిడ్డకు కాస్త ఎత్తులో ఏదైనా వస్తువులు ఉంచండి. ఆ వస్తువును అందుకోవానికి బిడ్డ విలబడటం, నవం చేసేలా ప్రోత్సహించండి.



- ☐ అడ్డుగా వచ్చిన వస్తువులను ఢీ కొట్టకుండా తనకు కావలసిన ఆటవస్తువులను అందుకోవడం



ఒక్కోసారి బిడ్డ చేతులు అడింపిస్తూ ఎదుటివారికి చాచిపెట్టే తగలవచ్చు. అప్పుడు వారిని కోపపడవద్దు. సున్నితంగా ఎదుటివారిని ఎలా స్పృహించాలి? చేపించండి.



- ☐ మాతృభాషలో ఒకటి రెండు సులభమైన పదాలు వలకడం
☐ చిన్న చిన్న పదాలు వచ్చు / రా లాంటివాటికి స్పందించడం

బిడ్డకు కథలు చెప్పండి. బొమ్మల పుస్తకాలు చూపండి. గట్టిగా పైకి చదవండి. పరిసరాల్లో కనిపించే వస్తువులను చూపించి వాటి పేర్లు చెప్పండి.



9 నెలల వయస్సు

బిడ్డలో క్రింది ప్రమాదకరమైన లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యసహాయం కోరండి.



చిన్న వస్తువులను పట్టుకోలేకపోతే



ఎత్తుకోమని చేతులు చూపకపోతే



పేరు పెట్టి పిలిచినా స్పందించకపోతే



బిడ్డ చూస్తుండగా మీరు ఒక వస్తువును సగం కనిపించేలా దాచిపెట్టాలి. అప్పుడు బిడ్డ దాన్ని వెతకలేకపోతే



ముఖాన్ని గుడ్డతో దాచిపెట్టి దాగుడుమూతలు లాంటి ఆటలు ఆడలేకపోతే

- ☐ మహిళా ఆరోగ్య కార్యకర్త పైవాటిని పరిశీలించి ☒ లేదా ☒ పెట్టాలి

18 నెలల వయస్సు

ఈ వయసులో బిడ్డ ఏం చేస్తుంది?

తల్లిదండ్రులకు సూచనలు

sachivalayam.com



- ☐ నిలబడటం, సొంతంగా నడవటం
- ☐ చేతులూపడం, చప్పట్లు కొట్టడం లాంటివి చేయడం

నడక నేర్చుకొని తోపుడుబండిని ఇవ్వండి



- ☐ చిన్న వస్తువులను గిన్నెలలో వేయడం



బిడ్డకు వివిధ రకాల బొమ్మలు ఇవ్వండి. వాటిని విడిగా గుర్తించి బుట్టలో వేయమనండి



- ☐ రోజూ చూసే వస్తువులను పుస్తకంలో గుర్తించడం



బిడ్డను చిన్న ప్రశ్నలు అడగండి. వారు మాట్లాడటానికి ప్రోత్సహించండి.

18 నెలల వయస్సు

బిడ్డలో క్రింది ప్రమాదకరమైన లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యసహాయం కోరండి.



సహాయం లేకుండా సొంతంగా నిలబడలేకపోతే



చిన్న వస్తువులను బుట్టలో వేయలేకపోతే



రోజూ చూసే వస్తువులను పుస్తకంలో గుర్తించడం



తల్లి హావభావాలను గమనించకుండా బిడ్డ తన లోకంలో ఉంటే



రోజువారీ కార్యక్రమాల్లో రెండు చేతులూ ఉపయోగించకపోతే (అంటే ఒక చేత్తోనే అన్ని పనులూ చేస్తుంటే)

అమ్మా, అత్త, తాత

అమ్మా, అత్త, తాత లాంటి చిన్న పదాలు కూడా పలకకపోతే

- ☐ మహిళా ఆరోగ్య కార్యకర్త పైవాటిని పరిశీలించి ☒ లేదా ☒ పెట్టాలి

24 నెలల వయస్సు

తల్లిదండ్రులకు సూచనలు

ఈ వయసులో బిడ్డ ఏం చేస్తుంది?

sachivalayam.com



బిడ్డకు నడవడానికి, పరిగెత్తడానికి, ఎక్కుదానికి అనువైన వాతావరణం కల్పించాలి.



☐ ఇంటిపనులు చేయడాన్ని అనుకరించడం (ఉదా: బల్ల తీర్చటం లాంటివి)



బిడ్డ ఏమిల్ని అనుకరించడాన్ని ప్రోత్సహించండి. వారి వైపువ్యాస అభివృద్ధికి అవకాశం ఇవ్వండి. వారు ఏదైనా చించడం వంటకం చేస్తే ఓపికగా ఉండండి.



☐ శరీరభాగాలను వ్యక్తిలో కాని, వస్తుకంలో కాని గుర్తించి, పేర్లు చెప్పడం

నిర్దిష్ట సమయానికి రోజువారీ పనులు చేసేలా ప్రోత్సహించండి. ఉదాహరణకు ఒకే సమయానికి పడుకోవడం, లేవడం మొదలైనవి.



బిడ్డ ముందు గట్టిగా చదవండి. ఒకే కథను పది పది రెప్పండి. తమకు సరైన గీతలు గీయడానికి పేపర్లు, రంగులు, చాక్ పేసలు ఇవ్వండి.

24 నెలల వయస్సు

క్రింది ప్రమాదకరమైన లక్షణాలు బిడ్డలో కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యసహాయం కోరండి.

sachivalayam.com



ఆటవస్తువును లాగుతూ స్థిరంగా నడవలేకపోతే



పెన్ను, చాక్ పేసులాంటి వాటితో ఎలాంటి గీతలూ గీయలేకపోతే

ఉదా:
అమ్మా పాలు,
అమ్మా రారా

రెండు పదాలు ఉన్న వాక్యాలు పలికలేకపోతే.



బైబై, నమస్తే వంటివి చెప్పినప్పుడు స్పందించకపోతే



శరీరభాగాలు గుర్తించకపోతే.



చిన్న చిన్న సూచనలు కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోతే.

☐ మహిళా ఆరోగ్య కార్యకర్త పైవాటిని పరిశీలించి ☒ లేదా ☐ పెట్టాలి

3 సంవత్సరముల వయస్సు

ఈ వయసులో బిడ్డ ఏం చేస్తుంది?

తల్లిదండ్రులకు సూచనలు

sachivalayam.com



☐ కప్పు / గ్లాసు ద్వారా పానీయం ఒలికిపోకుండా తాగుతారు.



బిడ్డతో ఆడుబయట ఆడండి. అది బిడ్డ చేతంలో చలనాన్ని తారీరక ప్రమమ కలిగించాలి.

పిల్లి, కుక్క పక్షి

- ☐ రోజూ దూరే పస్తువుల పేర్లు చెబుతారు. రంగులు, అకారాలు గుర్తుపడతారు.
- ☐ 3 నుండి 4 వరకు వాక్యాలు మాట్లాడగలిగింది.



పిల్లల ఆలోచనను పదునుపెట్టేలా బ్లాక్స్, పజిల్స్, రింగులు లాంటివి ఇవ్వండి.



☐ మెట్లు ఎక్కడం, దిగడం చేస్తారు.

బిడ్డ చేతులను, చేళ్ళను వివిధ రకాలుగా ఉపయోగించే అవకాశంఇవ్వండి. ఇది వారి నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చెందడానికి ఉపయోగపడుతుంది.



3 సంవత్సరముల వయస్సు

ఈ క్రింది ప్రమాదకరమైన లక్షణాలు మీ బిడ్డలో కనిపిస్తే మహిళా ఆరోగ్యకర్త / ఆశా / అంగన్వాడీ కార్యకర్తను కలిసి వైద్యసహాయం తీసుకోండి.



మెట్లు ఎక్కడానికి, దిగడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటే



మీ సహాయం లేకుండా తినలేకపోతుంటే



అర్థవంతంగా మాట్లాడకపోతే, ఇతరుల మాటలనే తిరిగి చెబుతుంటే.



నదీంచే ఆట ఆడలేకపోవడం.



పుష్టంగా మాట్లాడకపోవడం, నిరంతరం బొంగి కారుస్తుంటే

ఉదా: అమ్మా! పాలు ఇవ్వ.

సులభంగా మాట్లాడలేకపోవడం మూడు పదాలున్న వాక్యాలు చెప్పలేకపోవడం.

☐ మహిళా ఆరోగ్య కార్యకర్త పైవాటిని పరిశీలించి ☒ లేదా ☒ పెట్టాలి

Iron-Folic Acid Supplementation for Children aged 6 months to 5 years (Compliance Card)

IFA మందు తల్లికి ఇచ్చిన తేదీ		సీసా - 2	సీసా - 4	సీసా - 6	సీసా - 8
		సీసా - 1	సీసా - 3	సీసా - 5	సీసా - 7


నెలలు	6-12 నెలలు	1-2 సం॥లు	2-3 సం॥లు	3-4 సం॥లు	4-5 సం॥లు
జనవరి					
ఫిబ్రవరి					
మార్చి					
ఏప్రిల్					
మే					
జూన్					
జూలై					
ఆగష్టు					
సెప్టెంబర్					
అక్టోబర్					
నవంబర్					
డిసెంబర్					

గుర్తుంచుకోవలసిన ముఖ్యాంశాలు :

1. బిడ్డకు ఐరన్ ఫోలిక్ మందు ప్రతి బుధవారం, శనివారం ఇవ్వాలి.
2. 1 మి.లీ మందు పిల్లర్ ద్వారా వేయాలి.
3. బిడ్డ అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు, ఆహారం తీసుకోనప్పుడు ఈ మందును వేయరాదు.
4. ఆహారం తిన్న తర్వాతనే ఐరన్ మందు ఇవ్వండి.
5. ఒక ఐరన్ మందు సీసాలో 50 మి.లీ. మందు ఉంటుంది. ఇది ఆరునెలల దాకా వస్తుంది. మందు అయిపోగానే మహిళా ఆరోగ్య కార్యకర్త లేదా ఆశా కార్యకర్తను సంప్రదించండి.
6. ఐరన్ మందు ఒకసారి వేయగానే కార్డు మీద వేసినట్లు గుర్తుపెట్టండి.
7. ఐరన్ మందు వేశాక ఏదైనా సమస్య తలెత్తితే తక్షణమే మహిళా ఆరోగ్య కార్యకర్తను సంప్రదించాలి.



పాప : వయసు బరువు చార్టు 0-3 సం॥ వరకు (ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రమాణాల మేరకు బిడ్డ ఎదుగుదల చార్టు)



ఈ చూపు (పూర్వజాత వారాలను, నెలలను, సంవత్సరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి)

విశేషాలు



- తక్కువ బరువు ఉన్నా ఉన్నట్లుంది.
- బిడ్డను బిడ్డగా అంచనా వేయాలి.
- బిడ్డను బిడ్డగా అంచనా వేయాలి.
- బిడ్డను బిడ్డగా అంచనా వేయాలి.
- బిడ్డను బిడ్డగా అంచనా వేయాలి.

+ Care During Illness +

+ అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు తీసుకోవల్సిన జాగ్రత్తలు +

జ్వరం



- బిడ్డను బిడ్డగా అంచనా వేయాలి.
- బిడ్డను బిడ్డగా అంచనా వేయాలి.

ARI




- బిడ్డను బిడ్డగా అంచనా వేయాలి.
- బిడ్డను బిడ్డగా అంచనా వేయాలి.

అడ శిశువుకు కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్య సహాయం అందించండి



బాబు : వయసు బరువు చార్టు 0-3 సం॥ పరకు (ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రమాణాల మేరకు బిడ్డ ఎదుగుదల చార్టు)



సమగ్ర శిశు అభివృద్ధి కార్యక్రమం (ICDS)

- ❖ ఇది స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ, భారత ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమం. ఇందులో భాగంగా 6 సంవత్సరాలలోపు పిల్లలకు, గర్భిణీలకు, బాలికలకు, 15-45 సం॥ల వయసు స్త్రీలకు వివిధ రకాల సేవలను సమగ్రమైన దృక్పథంతో అందిస్తున్నారు.
- ❖ ఈ సేవలను పొందడానికి మీకు దగ్గర్లో ఉన్న అంగన్వాడీ కార్యక్రమం సంప్రదించండి.

ICDS కార్యక్రమ సేవలు

- ❖ శిశు సంరక్షణ ❖ టీకాలు ❖ పూర్వ ప్రాథమిక విద్య ❖ ఆరోగ్య పరీక్షలు ❖ రిఫరల్ సేవలు

అంగన్వాడీ సెంటర్ కు ప్రతి నెలా వెళ్లి మీ బిడ్డ బరువును తూచండి.



వ్యాధి నిరోధక టీకాలు - వివరాలు



ఇవ్వవలసిన తేది / ఇచ్చిన తేది

పుట్టినప్పుడు	పుట్టినప్పుడు	పుట్టినప్పుడు	పుట్టినప్పుడు
బి.సి.బి.	బి.సి.బి. 0 తర	హెప్పటైటిస్-బి (Birth dose)	అనుపత్తిలో ప్రసవం జరిగిన 24 గంటల లోపు

6 వారాలు (1½ నెలలు)	10 వారాలు (2½ నెలలు)	14 వారాలు (3½ నెలలు)	9 నెలలు
బి.సి.బి.-1	బి.సి.బి.-2	బి.సి.బి.-3	మీజిల్స్-1 / యం.ఆర్.1
పెంటా-1 (DPT+Hep-B+Hib)	పెంటా-2 (DPT+Hep-B+Hib)	పెంటా-3 (DPT+Hep-B+Hib)	జె.ఇ. - 1
బి.సి.బి.-1		బి.సి.బి.-2	విటమిన్-ఎ
రోటా-1	రోటా-2	రోటా-3	

మీ చిడ్డ మొదటి సంవత్సరం టీకాలు పూర్తయ్యాయి. శుభాకాంక్షలు

16 - 24 నెలలు

డి.పి.టి. 1 బూస్టర్	బి.సి.బి. బూస్టర్	మీజిల్స్-2 / యం.ఆర్.2	జె.ఇ. - 2
విటమిన్-ఎ 2	డి.పి.టి. 2 బూస్టర్	టి.టి 1 / టి.డి బూస్టర్	టి.టి 2 / టి.డి బూస్టర్

5-6 Years

10 Years

16 Years

టీకాలకు సంబంధించి 5 ముఖ్యమైన విషయాలు

- ఇచ్చిన టీకా ఏమిటి ? ఏ వ్యాధి రాకుండా అరికడుతుంది?
- టీకాలు వేసాక జ్వరం, దద్దుర్లు, గడ్డకట్టడం లాంటి చిన్న ఇబ్బందులు రావచ్చు, వాటిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి ?
- తరువరి టీకాలు ఎప్పుడు, ఎక్కడ వేయాలి ?
- ఈ టీకా కార్డును జాగ్రత్తగా భద్రపరచి, తరువరి సందర్భంలో తప్పక తీసుకువెళ్ళాలి.
- ఏ ప్రాంతాన్ని సందర్శించినప్పటికీ, ఈ కార్డును తప్పనిసరిగా వెంట తీసుకువెళ్ళాలి.



మధ్యలో వేయించని / తప్పిన డోసుల వివరాలు

తప్పిన టీకా యొక్క పేరు మరియు డోసు	తప్పిన తేది	తప్పడానికి కారణం	తప్పిన డోసును తదుపరి వేసే సెషన్	మహిళా ఆరోగ్య కార్యకర్త సంతకం

విటమిన్-ఎ

విద్య వయసు టీకా వేసిన తేది (నెల / తేది / సం.)

విటమిన్ - ఎ3 2 నెలలు

/ /

విటమిన్ - ఎ4 2.5 నెలలు

/ /

విటమిన్ - ఎ5 3 నెలలు

/ /

విటమిన్ - ఎ6 3.5 నెలలు

/ /

విటమిన్ - ఎ7 4 నెలలు

/ /

విటమిన్ - ఎ8 4.5 నెలలు

/ /

విటమిన్ - ఎ9 5 నెలలు

/ /

టీకాలు - అవశ్యకత

టీకా పేరు	పుట్టినపుడు	1½ నెలలు	2½ నెలలు	3½ నెలలు	9 నెలలు
BCG - క్షయ నివారణ	✓				
హైపర్టెటెన్-బి కాలేయ వ్యాధుల నివారణ	✓				
OPV - పోలియో నివారణ	✓	✓	✓	✓	
పెంటా - కోరింతదగ్గు, కంఠవాతము, ధనుర్వాతం, మెనింగైటిస్ వంటి రోగాల నివారణ		✓	✓	✓	
PCV - న్యూమోనియా నివారణ		✓		✓	✓
రోటా - అతిసార నివారణ		✓	✓	✓	
MR - తట్టు, పొంగు నివారణ					✓
JE - బ్రెయిన్ ఫీవర్ నివారణ					✓

Routine Immunization Counterfoil

కుటుంబ వివరాలు _____

_____/_____/_____

ఆశా కార్యకర్త సంతకం _____

పట్టికలు	1 1/2 నెలలు	2 1/2 నెలలు	3 1/2 నెలలు	9 నెలలు
తదుపరి టీకా తేది / /	తదుపరి టీకా తేది / /	తదుపరి టీకా తేది / /	తదుపరి టీకా తేది / /	తదుపరి టీకా తేది / /
టీకా పేసిన తేది (నెల / తేది / సం.)	టీకా పేసిన తేది (నెల / తేది / సం.)	టీకా పేసిన తేది (నెల / తేది / సం.)	టీకా పేసిన తేది (నెల / తేది / సం.)	టీకా పేసిన తేది (నెల / తేది / సం.)
OPV-0 / /	OPV-1 / /	OPV-2 / /	OPV-3 / /	MR-1 / /
Hep B given within 24hrs of birth / /	Penta-1 / /	Penta-2 / /	Penta-3 / /	JE-1 / /
BCG / /	Rota-1 / /	Rota-2 / /	Rota-3 / /	Vitamin A-1 / /
/ /	PCV-1 / /	/ /	PCV-2 / /	PCV-3 / /
/ /	IPV-1 / /	/ /	IPV-2 / /	/ /
/ /	/ /	/ /	/ /	/ /

అశా కార్యకర్త పారితోషకం వివరాలు : Full immunization (FIC) :

పూర్తయిన తేది ____/____/____ పారితోషకం తీసుకున్నారా? అవును ☐ కాదు ☐

అవును అయితే తీసుకున్న తేది ____/____/____

Complete immunization (CIC) :

పూర్తయిన తేది ____/____/____ పారితోషకం తీసుకున్నారా? అవును ☐ కాదు ☐

అవును అయితే తీసుకున్న తేది ____/____/____

విటమిన్ - ఎ3 - 9 దీకా వేసిన తేది (నెల / తేది / సం.)

విటమిన్ - ఎ3	/ /	విటమిన్ - ఎ4	/ /	విటమిన్ - ఎ5	/ /
విటమిన్ - ఎ6	/ /	విటమిన్ - ఎ7	/ /	విటమిన్ - ఎ8	/ /
		విటమిన్ - ఎ9	/ /		

16-24 నెలలు	5-6 నెలలు	10 నెలలు	16 నెలలు
తదుపరి దీకా తేది / /	తదుపరి దీకా తేది / /	తదుపరి దీకా తేది / /	[Return Card to Ministry]
దీకా వేసిన తేది (నెల / తేది / సం.)	దీకా వేసిన తేది (నెల / తేది / సం.)	దీకా వేసిన తేది (నెల / తేది / సం.)	దీకా వేసిన తేది (నెల / తేది / సం.)
DPT Booster-1	DPT Booster-2	TT	TT
Vitamin A-2			
MR-2			
JE-2			
OPV Booster			

మధ్యలో వెయించిన / తప్పిన దోసుల వివరాలు				
క్రమ	తప్పిన తేది	తప్పదానిది కారణం	తప్పిన దోసును తదుపరి వేసే సమయం	మహిళా అధికారి కార్యకర్త సంతకం
	/ /		/ /	
	/ /		/ /	
	/ /		/ /	
	/ /		/ /	



Be Wise!
Get your child
fully immunized

బిడ్డకు బిడ్డకు మధ్య 3 సం॥ల అంతరం పాటించాలి. ఇది తల్లిబిడ్డలు ఇద్దరికీ ఆరోగ్యకరం. కుటుంబనియంత్రణలో భాగంగా చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి. వాటిలో మీకు సచ్చిసది ఎంచుకోండి.



MPA ఇంజక్షన్ (అంతర కార్యక్రమం)



నిరోధ్ (కండోమ్)



● IUCD (CU 380 A & 375)
● ప్రసవం అనంతర IUCD (PPIUCD)
(ప్రసవం అయిన 48 గంటలలోపు
తీయించుకోవాలి)



● వోలీ మాత్రలు (మాతా N, మాతా D)
● Gentchroman (ఛామ, సిసెట్)
● ప్రొజెస్టిడాన్ - కేవలం మాత్ర మాత్రమే

ఐరన్ అందించే ఆహారము



నువ్వులు



కొబ్బరి



బెల్లము



దేవదారు గింజలు



మాంసము



రెడ్ కిడ్నీ బీన్స్








పచ్చని ఆకుకూరలు
మరియు కూరగాయలు



డ్రై ఫ్రూట్స్ మరియు గింజలు

పీఠుల యొక్క శాత్రుక, మోసక, భాషే మొలయు సాంఘిక అభివృద్ధి ప్రశంస గుర్తింపు

3 నెలలు	4 నెలలు	5 నెలలు	6 నెలలు	7 నెలలు	8 నెలలు	9 నెలలు	10 నెలలు	11 నెలలు	12 నెలలు	1 నెలలు
 చేతివేళ్లతో గట్టిగా పట్టుకోవడం	 చిన్నవస్తువులను తీసుకోవడం ప్రారంభం	 చిన్నవస్తువులను పట్టుకోవడం	 చేతులను పట్టుకోవడం	 చేతులను పట్టుకోవడం	 చేతులను పట్టుకోవడం	 చేతులను పట్టుకోవడం	 చేతులను పట్టుకోవడం	 చేతులను పట్టుకోవడం	 చేతులను పట్టుకోవడం	 చేతులను పట్టుకోవడం

பெரியபுத்தூர்

ॐ
 कर्म
 योग